



C1 - CARTA FORESTALE E DELLE ALTRE COPERTURE DEL TERRITORIO

Scala 1:10.000



Lavoro realizzato da:



Definizione metodologica, rilevamento e cartografia tematica:
 Settore Vegetazione e Fauna - P. G. Terzuolo, P. Camerano, G. Bertetti, C. Grieco

All'estimazione cartografica, acquisizione, elaborazione e produzione cartografia numerica: Settore Cartografia e Informatica - F. Mensio, G. Nicoli, R. Riccobene

Integrazioni settembre 2008

★ Localizzazione dell'area protetta nell'ambito regionale

AREE BOSCHATE

Quercio-carpineti (Codice NATURA 2000: 9160)

- OC10X Quercio-carpineti della bassa pianura
- OC10A var. con nocciuolo
- OC10B var. con latifoglie mesofille
- OC10C var. con quercia rossa
- OC10D var. a carpino bianco
- OC10H var. con robinia

Querceti a prevalenza di farnia con cerro subordinato presenti sul terrazzo principale, generalmente in mescolanza con carpino bianco, talora in purezza (var. a carpino bianco); robinia presente diffusamente e localmente abbondante per derivazione antropica (var. con robinia). Frassino maggiore ed ontano nero caratterizzano le forme di transizione con la vegetazione igrofila (var. con latifoglie mesofille). Variabile la presenza di altre latifoglie quali liglio cordato, ciliegio, acero campestre, ciavardello e quercia rossa d'impianto (var. con quercia rossa). Il sottobosco, caratterizzato da specie mesofile ed in modo più localizzato mesogrofite, spesso si arricchisce di nocciuolo (var. con nocciuolo) ed altri arbusti (biancospino, fusaggine, prugnolo, ligustro ecc).
 Struttura a fustata sopra ceduo, in mosaico localmente con ceduo matricinato e fustata anche da polloni.

- OC20X Quercio-carpineti dell'alta pianura ad elevate precipitazioni
- OC20B var. con rovere
- OC20H var. con robinia
- OC22X st. idromorfo a Molinia arundinacea

Querceti a prevalenza di farnia con rovere presenti sui terrazzi alluvionali antichi, in mescolanza con robinia (var. con robinia), localmente a dominanza di rovere (var. con rovere) e con cerro, quest'ultimo più diffuso nelle aree con maggiori limitazioni pedologiche (st. idromorfo a Molinia arundinacea); variabile presenza di altre latifoglie quali ciliegio, carpino bianco, liglio cordato, castagno reitto, nocciuolo ed arbusti mesoxerofili. Prevalentemente fustata sopra ceduo (anche da polloni) in mosaico con ceduo matricinato e limitate aree a struttura irregolare con scarsa copertura in libera evoluzione.

Robineti

- RB10X Robinieto
- RB10B var. con latifoglie mesofille

Popolamenti a prevalenza di robinia, di antico impianto in boschi preesistenti e successiva naturalizzazione, in mescolanza con sporadiche riserve di farnia, carpino ed in modo più localizzato frassino maggiore.
 Cedui sotto fustata e cedui matricinati.

Alneti pianiziali (Codice NATURA 2000: 91E0*)

- AN11X Alneto di ontano nero, st. umido
- AN12X Alneto di ontano nero, st. paludoso

Popolamenti igrofili e mesogrofili a prevalenza di ontano nero con frassino maggiore subordinato e localmente frassino ostello, presenti sui depositi alluvionali recenti e nelle depressioni, caratterizzati da aree paludose (st. paludoso) in mosaico con zone ad idromorfia temporanea (st. umido); mescolanza irregolare con salice bianco, nocciuolo e sporadiche altre latifoglie (olmo, liglio cordato, carpino bianco, ecc) e arbusti igrofili (viburno, biancospino, frangola, salice onirico, pioppo).
 Cedui matricinati invecchiati in libera evoluzione, strutturati per gruppi, localmente con grandi ceppaie di ontano nero emergenti dall'acqua.

Arbusteti pianiziali

- AS70X Arbusteto mesoxerofilo di Prunus spinosa e Cornus sanguinea
- AS70A var. arborata

Popolamenti di specie legnose a sviluppo arbustivo (h<3 m), costituiti da una fitta copertura di specie mesoxerofile (prugnolo, sanguinello, biancospino, ligustro), con sporadiche latifoglie a potenziale sviluppo arboreo quali robinia, cerro, carpino bianco, ciavardello, pero e melo selvatico; in mosaico retili di brughiere umide in lenta colonizzazione da parte di specie arboree per condizionamenti stagionali (baldia affiorante e reazione basica dei suoli).

Rimboschimenti pianiziali e collinari

- R110D var. a latifoglie autoctone

Giovani rimboschimenti effettuati a partire dagli anni '90 del secolo scorso fino al 2006 su ex-coltivi, pioppeti e per il recupero di aree estrattive.

ALTRE AREE NATURALI O SEMINATURALI

- Stagni artificiali e canale irriguo

ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Popolamenti da giovani a maturi su terre poco adatte
- Giovani impianti di latifoglie spontanee effettuate su ex-coltivi

AREE AGRICOLE

- Coltivi a riposo
- Seminativi in asciutta
- Seminativi irrigui con prevalenza di risaia
- Inseccamenti rurali, beni architettonici e relative pertinenze (giardini, orti, frutteti)

1-28 Particolare forestale e relativa numerazione

Viabilità di interesse forestale

Area occupata dalla garzaia nel 2006

Filari arborati e siepi campestri

Viali di quercia rossa residui nel Bosco delle Sorti al 2006

Area a Parco

Zona di Salvaguardia

P Parcheggio

R Rifugio

A Area pic-nic e giochi

F Area pic-nic

AL Fontanie

